

Tránh Thai Vĩnh Viễn (Triệt Sản)

Triệt Sản Nữ Những biện pháp này chặn hoặc phá vỡ ống dẫn trứng để trứng không thể gặp được tinh trùng. Có một số cách để bác sĩ thực hiện thủ thuật này.		Triệt Sản Nam Biện pháp này không cho tinh trùng rời khỏi tinh hoàn.	
Biện Pháp Phẫu Thuật ("ống dẫn trứng" hoặc "thắt ống dẫn trứng")	Biện Pháp Không Phẫu Thuật (<i>EbBure</i>)	Cắt ống dẫn tinh	
Biện pháp này thực hiện như thế nào?	Các bác sĩ tiếp cận ống dẫn trứng thông qua hai vết cắt nhỏ ở bụng. Sau đó, các bác sĩ sẽ dùng kẹp hoặc dải băng để thắt ống dẫn trứng hay cắt bỏ một phần của mỗi ống dẫn trứng.	Bác sĩ đặt một vòng xoắn kim loại vào mỗi ống dẫn trứng. Bác sĩ tiếp cận ống dẫn trứng thông qua âm đạo. Không cần cắt mổ.	Biện pháp này có tác dụng bằng cách cắt ống dẫn tinh ở thừng tinh chứa tinh trùng.
Biện pháp này có tác dụng tốt đến mức nào?	>98%, thay đổi theo biện pháp	97%	>99%
Biện pháp này tốn bao nhiêu tiền?	Được bao trả bởi hầu hết các chương trình bảo hiểm và Medicaid (nếu trên 21 tuổi). Nếu không được bao trả thì sẽ tốn \$1.500 đến \$6.000.	Được bao trả bởi hầu hết các chương trình bảo hiểm và Medicaid (nếu trên 21 tuổi). Nếu không được bao trả thì sẽ tốn \$1.500 đến \$6.000.	Được bao trả bởi hầu hết các chương trình bảo hiểm và Medicaid; KHÔNG được Medicare bao trả. Nếu không được bao trả thì sẽ tốn \$350 đến \$1.000.
Ưu điểm	Những biện pháp này giảm lo lắng về việc mang thai, cung cấp biện pháp tránh thai vĩnh viễn và hiệu quả cao. Một số biện pháp có thể thực hiện được ngay sau khi sinh con. Có tác dụng ngay lập tức.	Biện pháp này giảm lo lắng về việc mang thai, cung cấp biện pháp tránh thai vĩnh viễn và hiệu quả cao. Quý vị có thể trở lại hoạt động bình thường trong vòng 24 giờ. Có thể thực hiện tại văn phòng bác sĩ. Không gây mê toàn thân. Không cắt mổ.	Biện pháp này giảm lo lắng về việc mang thai, cung cấp biện pháp tránh thai vĩnh viễn và hiệu quả cao. Biện pháp này hiệu quả hơn và rẻ hơn hầu hết các thủ thuật triệt sản nữ. Có thể thực hiện tại văn phòng bác sĩ. Không gây mê toàn thân.
Nhược điểm	Quý vị có thể cảm thấy hối tiếc. Không phòng chống được HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu quý vị không thể gây mê toàn thân hoặc có một số bệnh về cơ quan sinh sản thì biện pháp này không dành cho quý vị. Thủ thuật này phải được thực hiện trong phòng mổ của bệnh viện. Rủi ro bao gồm: nhiễm trùng, chảy máu và các phản ứng với gây mê toàn thân. Hiếm khi xảy ra mang thai. Nếu có, nguy cơ mang thai lạc vị trí (ngoài tử cung) sẽ là 30%. Quý vị có thể cảm thấy đau sau khi làm thủ thuật và cần một hoặc hai ngày để hồi phục.	Quý vị có thể cảm thấy hối tiếc. Không phòng chống được HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu quý vị nhạy cảm với niken hoặc có một số bệnh về cơ quan sinh sản thì biện pháp này không dành cho quý vị. Rủi ro bao gồm: nhiễm trùng và chảy máu. Có khi cần đến 3 tháng mới có tác dụng. Quý vị nên sử dụng biện pháp tránh thai dự phòng trong thời gian này.	Quý vị có thể cảm thấy hối tiếc. Không phòng chống được HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác. Nếu quý vị đang bị nhiễm trùng dương vật, tuyến tiền liệt, hoặc thừng tinh (chẳng hạn như STI), thì biện pháp này không dành cho quý vị. Rủi ro bao gồm: nhiễm trùng và chảy máu. Có thể vẫn có tinh trùng trong tối đa 12 tuần. Quý vị phải sử dụng biện pháp dự phòng cho đến khi kiểm tra tinh dịch cho thấy không có tinh trùng. Quý vị có thể cảm thấy đau sau khi làm thủ thuật và cần một hoặc hai ngày để hồi phục.